金 遺 要 略 方 論 本 義

逆者占之可玩也而病之消長進退 形状者象之可觀也其審於標本從 也綱中有目易之爻也其證於脉色 寒論金匮要略釋義 死之機遠之取於天地運會近之 云醫者易也故疾也有 絗

比於天下國家無不以扶抑為體以 矣而俱可以陰陽之至易簡者盡之 大夫鄙為技術之微斯其本源逐大 之精意當於醫小中水馬秦學士 救為用雖病情到柔變化無窮極 不與易相通乎是以三代以後里

實開乾閘坤分三升立人極而宗萬 世也軒歧之書類春秋戰國人所為 數千百年得一長沙太守仲景先師 闡微言明大意名為総軒岐而起其 方書沒敝於道聽塗說之市會上下 而流末不競託迷於汗牛充棟之

而託 信之故馬世人業此者以讀 文義似平順而折與篇章似散之嚴如禮經也仲景所者起於 其書具在試 通會讀之反難於 松上古文義順澤篇章聯貫讀 披閉而 得解 自得其可疑可 且易於疎漏 後 漢代 碎而

晋之法讀仲景諸書其文朴而不華 諸方亦謂頭病但治 居馬隨以求後人諸方之法用仲景 其言淡而無奇終莫得精微廣大所 斯已耳而百無一效於是競言仲景 之方不可用遂置仲景之書為不可 頭脚病但治 脚

讀而荆棘陷穿遍於家守二氣失其 瑟未有得當者矣余自無醫喜玩軒 故也不於仲景之書先求明其理乃 規規馬取用其方刻舟電劍膠柱鼓 良能萬物野其生命可勝慨哉此何 歧之書既乃知讀仲景所著往往以

間守漳逾五六年矣時和年豐訟稀 印まり 書不易了了也雖然畏難的安私心 之道則終其獲誅然之快甲午乙未 所言釋仲景方得明以此知仲景之 仲景所言釋軒岐不明者而以軒岐 竊憾蓋不能批 卻導家得迎小而鮮

得天下之理者合仲景先師奚觀乎 乃不揣固陋以讀易之心思識解讀 事簡清齊下簾當試點易火而悟其 句比馬次之條分樓附馬次之分章 傷寒論金匱要略諸者先為字櫛 務成物首在於醫而合乎易簡以

端自多好略惟 願觀者細玩 原文各 與易無二義也自童及艾讀之數 別段馬次之衆證互明馬次之要終 原始貫串通徹馬而知仲景之書 -註之旬月而畢人以為敏不知由 者漸矣然其間吏塵嬰人殊少静

後於仲景参伍錯綜神明變化於醫 病之變而玩仲景之法法即占也然 各憂虞之故惠迪從逆亦必曉然大 能無不相合於易則古运得失悔 景之文文即解也臨時者動也觀 心解平日者静也觀病之象而玩

是叙其意於首 贅物云爾何足與於有無之數乎用 康熙辛丑季夏柏鄉魏荔形念進氏 白矣於予之註不過解拇技指視為 題

傷寒論次校定金匱玉函經今又校成此壽仍以逐方 治病芸有未備 張仲景為傷寒雜病論合十六卷今世但傳傷寒論 乃錄而傳之士流才數家耳嘗以對方證對者施 卷雜病未見其書或於諸家方中載其一 金匱要畧方論序 金紅度を見からな所に定せ 人其效若神然而或有證而無方或有方而無證救 士王珠在館閣日於蠹簡中得仲景金匱玉函要畧方 三卷上則辨傷寒中則論雜病下則載其方針療婦 **國家部儒臣校正醫書** 一二矣翰林 臣奇 先校定 之於 疾

故断自維病以下終于飲食禁忌凡二十五篇除重複 家之方附于还篇之末以廣其法以其傷寒文多節畧 惟 次于證候之下使倉卒之際便於檢用也又採散在諸 合二百六十二方勒成上中下三卷作二名曰金匱方 合理国でイフト門フィー |上不承大統撫育元元頒行方書拯濟疾苦使和氣 每觀華化凡所療病云多的奇怪不合聖人之經 臣奇當該魏志華化傳云出書 謂活人必仰景之書也大哉炎農聖法屬我盛旦恭 一卷日此書可以活

金貨與原作人物本語 理 **為溢而萬物莫不盡和矣** 衡尚書都官員外郎 臣林億等傳上 大明應天徐鎔謹按文獻通考二百二十二卷中金 朝王洙得于館中用之甚效合二百六十二方捷 和集設答問雜病形證脉理參以療治之方仁宗 置玉函經八卷條下晁氏曰漢張仲景撰晉王权 所得名日金匱玉函要畧方係五代時攺名耳所 此幷前林序云依舊名曰金匱方論則王殊館中 H 孫奇尚書司封郎中充秘閣校 太子右對善大夫臣高保 ----

選論甚精指事施用即今俗所分傷寒論金匱要 仲景論廣伊尹湯液用之多驗王叔和撰次仲景 也金匱方論三卷傷寒論十卷似西晉王叔和選 畧是也孫真人千金云江南諸師秘仲景傷寒方 及朱相沿書名也今单名金匱要畧而去其玉画 集撰次後俗傳書名也若金匱玉画要畧方五代 已無矣夫金匱玉函經八卷東漢張仲景祖書名 以通考只云金匱玉函經也是金匱玉凾經元時 一字愈遠而愈失其真矣又據晉皇甫諡甲 乙云

Kuntakah 17 AH Kasa 治傷寒有法治雞病有方葛稚川作肘後孫真人 金匱要畧爲二書也成聊攝明理論云自古諸方 邈則未能詳仲景之用心者是朱時纔分傷寒論 世如此然其言雅非精于經絡不能曉會若孫思 寒論為活人書昔人叉以金匱玉函名之其重于 寒治法者長沙太守一人而已華吃指張長沙傷 作干金陶隱居作集驗玄宴先生作甲乙其論傷 藥准云仲景為羣方之祖朱奉議活人書云古人 法不傅是叔和選論思邈亦未曾研也惟文潞公 =

というできているのと言う 皆近代方論而已但究其末而不求其本唯近世 文亦立奧以致今之學者尚為難焉故今人所習 朱奉議多得其意遂以本仲景之論而兼諸書之 年有仲景方論一十六卷使後之學者有可依據 是以仲景本伊尹之法伊尹本神農之經醫帙之 歷歲浸遠難可考評惟仲景之方最為衆方之祖 中特為樞要參令法古不越毫末乃大聖之所作 說作活人書其言直其類辨使後學者易為彝檢 也劉河間原病式云自黃帝之後二千五百有餘

達其趣欲得一師指之遍國中無有能知者故於 仲景書尚未分傷寒雜病為二門也或金匱玉函 方之祖治雜病若神後之醫者宗內經法學仲景 傷辨惑論日易張先生云仲景藥為萬世法號 經八卷坊間分作十六卷亦未可知故東垣內外 醫壘元戎云折中湯液萬世不易之法當以仲景 十載矣所仰慕者仲景一書為尤然讀之未易洞 施行故今之用者多矣據河間十六卷之言此時 心可以為師矣王海藏此事難知云余讀醫書幾

金世界名大学本芸 為 變易干狀萬態無有一毫不出于仲景者潔古張 景書又湯液本草于孫葛朱王外添王叔和范汪 農法伊尹體箕子而生也唐宋以來如孫思邈葛 乎世莫有能知者又云仲景廣湯液為大法晉宋 元素其子張璧東垣李明之皆祖張仲景湯液惜 胡冷錢仰陽成無已陳無擇云其議論方定增減 雅川朱本議王朝奉董其餘名醫雖多皆不出仲 以來號名醫者皆出于此又按丹谿局方發揮或 祖又云金匱玉函要界傷寒論皆張仲景祖神 M

ないようなものであることが 修合終難踰越矩度又日圓機活法內經具舉與 經意合者仲景書也仲景因病以制方局方製藥 取則焉曰要略之方果足用乎曰天地氣化無窮 略二十有三門何也答曰仲景諸方實萬世醫門 問 以俟病據數家設是元未及我 良者引例推類可謂無窮之應用借令略有加減 之規矩準繩也後之欲為方圓平直者必於是而 人身之病亦變化無窮仲景之書載道者也醫之 日仲景治傷寒一百一十三方治雜病金匱要

國朝初醫家方分傷寒雜病為二家也只因聊攝 明 金 得此失彼各自專門為粗陋又真華劒復合昌鏡 吳君校壽 前仲景能治傷寒而不能療雜證也冤哉余素慨 注金匮論所以俗醫分為二門致今時象口 再圓天作之合云爾萬曆戊戌孟夏吉日 十八歲撰成明理論八十歲時注完傷寒論未服 理論乖散失羣已近五百年因謀諸新安師 **置方論與傷寒論睽離孤處及注解傷寒論** 梓成濟縣而得會遇庶業醫者弗致 辭

Activority する。 日 鉄	白术附子湯	防已黃耆湯	麻黄杏仁薏苡甘草湯	大承氣湯	栝樓桂枝湯	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	臟腑經絡先後第一	卷上	金匮要畧方論目錄
	甘草附子湯	桂枝附子湯	草湯	麻黄加术湯	葛根湯				

A.C.L. A.C.L. 日錄 中風歷節第五 附方 牡蠣湯 蜀漆散 柴胡桂薑湯 桂枝芍藥知母湯 防已地黄湯 侯氏黑散 鰵甲 煎丸 烏頭湯 柴胡去牛夏加栝樓湯 白虎加桂枝湯 頭風摩散 風引湯 ŀ

黃耆建中湯	天雄散	黄耆桂枝五物湯	血痺虚勞第六	越婢加术湯		續命湯	附方	磐石湯
薯蕷圓	小建中湯	桂枝加龍骨牡蠣湯			八味圓	三黄湯		

湯	金匠要學方論本義	越婢加半夏湯	葶藶大棗瀉肺湯	澤漆湯		 	肺痿肺癰欬嗽上氣第七	炙卅草湯	附方	酸聚湯
		見湯 小青龍加石膏湯		麥門冬湯	厚朴麻黄湯		上氣第七			大黃盛蟲圓

栝樓薤白白酒湯	胸痺心痛短氣第九	茯苓桂枝甘草大棗湯	奔稚湯	奔 稚 氣 第 八	桔梗白散	桂枝去芍藥加阜莢湯	计 草湯	附方	
· 栝樓薤白半夏湯		東湯	桂枝加桂湯		葦並 湯	- 莢湯	生薑甘草湯		

金百里里方渝太晚一日條	赤圓	大建中湯	厚朴三物湯	厚朴七物湯	腹滿寒疝宿食第十	赤石脂圓	薏苡附子散 桂	茯苓杏仁甘草湯 栖	松實薤白桂枝湯 人
	烏頭煎	大黄附子揚	大柴胡湯	附子粳米汤		九痛圓	桂枝生薑枳實湯	橘皮枳實生薑湯	人參湯

茯苓桂枝甘草湯	痰飲软燉第十二	麻子仁圓	五臟風寒積聚第十一	卷中	瓜蒂散	柴胡桂枝	附方	當歸生董牛肉湯	Visit
		甘草乾薑茯苓白术湯				走馬湯		烏頭桂枝湯	

<u> </u>	Assemble Assemble 1 日本
克	茯苓五味去桂加乾薑細辛湯
茯苓桂枝五味甘草湯	茯苓飲
	附方
五苓散	小半夏加茯苓湯
防己椒目葶藶大黄圓	小半夏湯
厚朴大黄湯	澤瀉湯
术防己加茯苓芒消湯	术防已湯
小青龍湯	大青龍湯
十棗湯	甘遂半夏湯

以已初考湯	违如 涉
ケーをより	戊)和100
	水氣病第十四
猪苓湯	茯苓戎鹽湯
滑石白魚散	清 灰散
栝樓瞿麥圓	文蛤散
	消渴小便利淋第十三
十半杏大黄湯	苓甘五味加薑辛半杏大黃湯
半夏杏仁湯	苓甘五味加薑辛牛夏杏仁湯
苓桂五味甘草去桂加乾薑細辛半夏湯	苓桂五味甘草土
3	Attended The Manufactures And Actions of the Manufactures of the M

金面要客方論本義一目錄 黄疸病第十五 枳术湯 茵蔯蒿湯 茵蔯五苓散 梔子大黃湯 桂枝去芍藥麻黄綱辛附子湯 桂枝加黃耆湯 杏子湯 甘草麻黄湯 消石礬石散 黃耆芍藥桂枝苦酒湯 大黄消石湯 猪膏髮煎 麻黄附子湯

驚悸吐蚵下血胸滿瘀血第十六 嘔吐噦下利第十七 附方 黄土湯 半夏麻黄圆 黃苓加半夏生薑湯 桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨被逆湯 茱萸湯 麻黄醇酒湯 瀉心湯 半夏瀉心 柏葉湯

ないはいるとうないと 日妹 猪苓散 **犬黄甘草腸** 小柴胡湯 通脉四逆湯 白頭禽腸 生薑牛夏湯 文蛤湯 橘皮竹茄湯 小承氣湯 桃花湯 桂枝湯 紫象湯 梔子豉湯 半夏乾蓬散 茯苓澤瀉湯 大半夏湯 橘皮湯 四逆湯

今には中国やフナラス・ラー 跌蹶手指臂腫轉筋隆狐疝蚘蟲第十九 府難腸癰浸淫第十 附方 排膿湯 薏苡附子敗醬散 黄芩湯 梨蘆甘草湯 訶梨勒散 王不留行散 排膿散 黄連粉 大黄牡丹湯 雞屎白散

AND ALL TO ATT LAND IN A	白术散	葵子茯苓散	乾薑人參半夏丸	膠艾湯	附子湯	婦人妊娠第二十	卷下	烏梅圓	蜘蛛散
		當歸散	當歸貝母苦參丸	當歸其藥職	桂枝茯苓丸				甘草粉蜜湯

.

全日日でる中人が日本 婦人 婦人產後病第二十 附方 半夏厚朴湯 八雜病第二十二 竹葉湯 温經湯 竹皮大圓 枳實芍藥散 三物黄苓湯 陽旦湯 白頭翁加甘草阿膠湯 甘草小麥大棗湯 內補當歸建中湯 下瘀血湯 土瓜根散

金五重包专输工作、目錄	展牙湯	腎氣圓	**************************************	大黄甘遂湯	旋復花湯
	小兒疳蟲蝕齒方	蛇牀子散	紅藍花酒	抵當湯	廖蓝湯

知肝傳開當先實開四季脾王不受邪即勿補之中下 問日上工治未病何也〇師日夫治未病者見肝之病 不曉相傳見肝之病不鮮實脾惟治肝也是肝之病補 金匱要畧方論本義 医軍界方部本義 老之 臘斯經絡先後病脈證第一 松江何 廣平冀 柘鄉魏荔彤念庭釋義 男士說校 棟路吉評定 炫嗣宗 **脉澄二條** 刋

氣盛則傷肺。肺被傷則金氣不行金氣不行則肝氣盛 甘入雁雕能傷野氣微弱則水不行。水不行則心火 藏华此 則 用酸助用焦苦益用甘味之藥調之酸人服焦苦人心 不在用之。經日。虛虛實實補不足損有餘是其義也。餘 肝自愈此治肝補脾之要妙也肝虛則用此法實 几事言也篇中皆設為明豆止醫藥為然。中庸云了那之熟。宜加於焦頭爛紅人貽悔 也治之預則用力 以胎悔也治之一 病 額之 明問立 炦 於見 也 多,所 工則 疑問病 病成 未 水 灰 水 水 灰 水 水 大 **病為条徙治** 則

若夫謂矣旺不數上愈病凶施必起肺五洪 大肝頭不消得若旺也必既與明腎生職助之病聽息肆適十然傳兼天平腎腎之 其病治相之其當八臟於理行五起腎氣履 子必頭傳理侮其日氣雕氣有氣心生旺端者。勢肝脚之上也際合之上而悖順心肝則于以即虚病義工設則算衰工言也布起順發始四 之以者治見方過脾畸旺必則周四肺則其序時 助多脚肝知補旺零與先醫子時肺吉所則 母虛一之之脾自以時實家所順尅也生不 之者病病若又不應令脾亦謂行肝病由您始 势补轨不中犯受五相使不君之逆则肝故乎 解工實那行流肝外子房則侮生先春 焦補方實以實即各通病乎修而凶其心引五 苦必如雁下之勿旺四以此之後也所心肝臟 入用庸惟即戒補七季不養吉不故起生以之 心酸醫治不矣之十之得矣小致善肝脾爲氣 助正之肝能但而二月傳所人倒養 起 脚之始心治學也晚此肝日每而以悖行生肥生準于 也也所讚袞自之季可肝之逆者胛肺云肝

肝靴 生氣得春夏 是一金氣足 水氣金乃積 八淡明仲县 ķμ 則茂盛 陽相 斯林典之 冬寒凉 隂 而 不針必母世工可而氣厥敢得不足脾也 在特大也之庸善冁不陰來火食以能 然治易其轉行生侮而肝 治顧則意肝肽母 哉肝慮肝而故欣之 認而寒必肝之於木肺日向氣而氣之 傷 五暢金 治泥水木治之用 祭而傷 氣肝虛也行茂 常然必肝及弱 飲治者此之條得非也自 究肝必治理達溫真且安陽水 方不不用肝蓋而故傷于故者不之甘 泄耳能效效此必如病云肺是心故行何味所 虚解舒也則法補是自和也而火水此病 又暢不必而脾之愈金使肺足不水 如治肝之周矣氣頑金而行為 治腎無要詳一乃燥畏肝而陰 知肝已脾虚難妙縝治不之火陽心寒所此以 實度且則理也密肝行氣制暢 虚者此治補矣非而之也不而達氣水然反其 則金心其今上後法金伐。不水足氣者治病

可衰縮水以 生木二説矣 **船** 枯 夫 受邪人臟腑為內所因也二者四肢九竅血脈 萬物。如水能浮舟。亦能覆舟。若五臟元真通暢人即 和客氣邪風。中人多死于般灰難不越三條。 ないと 人後之一 人稟五常因風氣而生長風氣雖能生萬物亦能 反以矣。三 不通為外皮膚所中也三者房室金刀蟲 神學足 虚日法。 者者之虚 再補禁虚 隅 本餘補足能之者之損類 焉師 更間損是有推 明辨之犯餘矣。 餘虛方實蓋師 藏實合實虛 而於之者 此為經禁復經舉補言也攻以 獸 相傳建 者。經 害

吐 此詳之。病由都盡若人能養順不令邪風干忤經絡。適 為血氣 有衰病則無由入其腠理脹者是三焦通會元真之處 重房室勿令竭乏服食節其冷熱苦酸辛甘。不遺形體 会正事をフララス主 經絡。未流傳腑臟。即醫治之四肢才覺重滯。即導 納鍼灸膏摩勿令九竅閉塞。 原 之義人之義人 所注。理者。是皮膚臟腑之文理也。 貴其預滋 風 叙 大生, 矣 益, 木常, 而能 And the second s 成金者得不萬 更能無犯王法禽獸災 水不再得 木尼申長善 火之其生為 土氣本久謂

三世間 日ナリス町 スキン 以除調除養之宣實平其舟也兩應風時氣有投攝陽循元外條所宜之乘生覆氣布在容錄內不環與是于以且義此能舟復八人 氣而失偏無也哉體善能也氣日 而終必聖而全左見而順喻 常此使哲後此右人生平乎于和身之知可五萬十几生人風 之多真和身之知可。五萬子丁生人風是生斯名至外此可與五以常民然逆之生氣人在生 則於撤明以天常踐之對之平氣而亦亦非死其哲疾氣之形氣有身生使後且萬 可保保病相氣盡必萬上之有後占物 不障身不通即性內物代氣所天如之流非 時悔而之生於係也明况天健保御斯一。行至 縣客至而人于醫其我工。有全氣而 之風氣計長氣五雖五躬裁所調之已生行能正氣邪也生得藏而常之成散潮說水于者如 之不輔亡浮也能風氣 若其 畅而言。 是魔夫氣轉為氣氣克相擾舟乗浮氣也乎。也得不可相五而所自能亂之此舟。長而然

也 雅系素而入 高者正氣閉

强恪受自之聚四傳二而所本越客化 弱营那通支则肢不者後因表 致四經也證條邪 皆脉健壅肢絡必也知 風 凝所有塞九宏五而 風滯由力。不竅虛臟 之九通雖開六則者萬 **醛竅者于** 門府 舍 道開亦臟揖之 氣闔心腑盗中。 思行得臟爲此 腑 血宜腑末五 之爲藏 走也 氣外。尤限表也病 塞營臟充而眞可證 衛腑滿血失乘也 動得之 **韡**必

通精邪而以

故可內受

輸積後相也投有哪不

金重要を方論本義 関中也氣絡刻偶能悉也病空亡猛傷也則 摩寧經惟旺之弗然全盡此兼虚其獸房亦內 無不絡其血表救無養丁亦喪亡血毒帷五之 非至之五盛治也意慎此五其血精蟲推臟邪 內重疾藏藥之再不之能藏兩者損所席元氣 保平多元力驅遇過道加失即未血伏之其有 老五再致真有風良適容謹守臻有亡也間失餘 之藏或醫有所散醫中氣焉之死精有房男守 元醫藥失憑那於經那可故亡不相室女之為 真藥不斯藉病未絡風以也蓋枯闕之宴故積 外之靈正而可流而自與以精竭屬勞好也聚 禦餘傅氣肆已傳已不言此與者之損之三格 客佐流泵其矣辦必令醫三血也義其際者阻 以漸竭祛且臟不干藥者莫苟精精刀房而 邪導深正除五之能忤之詳非損損金錫室四 風引五血之藏時中經仁之五其者亦鼎金肢 勿吐藏枯用元郎腑絡術萬藏一未蟲鑊孙九 令納元耗至真從中也矣病之必有獸在蟲竅 九銀真即易常其臟即若根元見血之側默見 籔炙之淺易保經頃或人源與疾不傷而所病

也之是交形入度腹褐獸通 循賢理培者勝版從其 通於真恐匹與養藏理于服精 會驅之人凡氣聖府矣是食於殺處以人無賢之况形節 氣 传之謹鍼表 **修表深體具節地言炙** 得受身也而不令 而細形外寫則之藏經致熱養心行摩然在微體而不修道府絡遺五無寡無外一 在微體而 外分於忽足 與如者不以味奢慾犯治 養是形况衰調侈 者豈也體再朽其之 而之深之苦智人臨何泄又 裏而忠酸淡道淵 身也為而 明兼

也之成则氣膚輳焦朱精其知血之命二 問 所言者氣也而未有有其氣而不存其理者也。 一大極精粗本末無彼此者此也就謂黃帝岐伯之也朱子所謂五行一陰陽五殊二實無餘久也陰陽如大小本末內外俱無門氣無近女化生萬物者此成其為一物一太極而已問子所問無極之與二五成其為一物一太極而已問子所問無極之與二五成其為一物一太極而已開子所問無極之與二五成其為一次,本末內外俱無門氣無。二氣即無極之與二五扇之文理何以亦闕藏腑非五藏有元與則三焦無 腹 金田恵かっするよりをと 中痛苦冷者死一云腹中冷 病 之血 人有氣色見於面部願聞其說師日鼻頭 人理何以一人處也,言以為,以為 八小本表丙,八則周身何,但何以亦 一有寒色白者亡血也設微赤非時 內外俱無二、氣無二、每四以為腠而腠何以有 馬騰·而 藏辦非 言理是 鼻頭色微黑者。有水氣 文理平前之文理也之文理也 也,是 色青

治在上 黃者便難色鮮明者有留飲 動摇振振者不治。 師旦吸而微數其病在中焦實也當下之即愈虚者不 氣者肺痿唾沫。 師 不徹者。心膈間病語聲啾啾然細而長者。頭中病。 師日病人語聲寂然。喜驚呼者骨節間病語聲暗暗然 目正圓者煙不治又色青為痛色黑為势色亦為風色 公门道名大河本新 日息摇肩者。心中堅息引胸中。上氣者。效息張口短 一焦者。其吸促在下焦者。其吸遠此皆難治呼吸 痛 作

呼 宜制 水西水土 而真陽 Ŀ 不 能制 泛

1

1

多 至色發莫鼻即生日之 音乎相于青見不祖父氣鼻間外五符 于青見不祖父氣鼻 頭 五 于稟爲母息 三始病諦 鼻受肺之 肝 脉 色青。而反色白。非其時色 之精月生 動 色頭 明 老有厥此 開血生之必 乙 乙 小 五 卷有厥 肝 身 而 竅 也 體 物 有 無 饒 人 藏 之 水 而 氣 頭 五 而 而 質 也 病 從 虧 望 元 本 明 草 中 四 人 色 得 而 閩 真 常 小者。因 1 時 腎絶屈以之一 病填藏問 通月 水不腹可真身 泛還,中驗色之 而 滊 汽消真切 水不股內共 不不 息骨胞 公息隱之色 泛遠中驗色之息骨胞 公息隱之色溢 斯五亦元即骼中 心焉微大脈 為 斯五亦元郎 磐 五一 公故難 畧聲 動假 令肝 死痛藏必氣繼五 矣肝之隨者而月 脉皆當 月月 音 而師測也 王色青 氣 肝虛 病。 内 也出臟以 鄭入之名 也再色無外所,即聲視有 四 也陷頭而氣為液月

血精 水 氣者。此邪足而博內色死為者虛氣浮態所所若實覽經可之秋心弱有 **緊**義月 而其深圓之耳脈亦此旺也以 3 藏盡之時 篇野山則肺而 目前 真醇騎推師而此肺金肺 也其陰瞬必及不 而臟 色面 過頭推受 其簡通至月也枯而 大要面于

在有可而時亦主

而

也義 不頭暗心久肝骨師物辨照五邪 而又 肩就 動氣 卷之。 小示 心。一般 之可。至 那 日。息 **充**聲骨常日乎賢 布狀節驚病哉格 氣 搖 肩 啾陽聲間其歷 心者 明明病難 在账虚暗必來寂 中心 州於色也 引頭然氣暗有骨伸,中細弱然風節 觸,斯而則不熱間 其雖 阻堅 息 其 唯長產徹之病 正搖 氣肩 吟者喑者邪者者

焦吸實巴中去氣為當師之沫津也為引當之 其短之剷焦其以陽下又洞也枯故諦胸加升 吸呼法浮則實救陽之於然此氣知審中意隆 乾兼短此中搖 也那明可吸可實足則其 吸盛之救數調乃中呼吸 長而病援則矣胃焦必吸 黏悟者家氣 呼能在乎。中若實熱遲而 反沫肺之者 必使上故氣吸之盛吸微 **微之臟息咳其** 多外津而暖為 短正焦不欲微質而多數 以氣其治絕數下津於其 | **幡證枯虛則堅** 病不吸此數而之 **哂可氣實氣而** 不呼病 邪舒必示吸更即足也在 又徵耗之亂邪 結也促人自無承战吸中 無信之邪而實 津焉可叉逆正而蓋驗當故虛 而病促以救實氣思為 思在短辨氣熱之吸陰實 但必者別息循 得下也虚根在類陰呼也

不若使木為腑候疾師而此右陽治氣 之見時之肝病之之寸色肺而四脉之氣矣口 之 决散呼之句此 人矣吸病则病 卷脉之尅時過脈也脈脈衰 之見白我各弦也動動動旺一矣春之隨雖而之非者合 其之賊其似其甚動 人肝邪色有面者脈左天 死以周盛之 肝脈反則病部大也右 藏不足脈而之而言手 治筋結氣 必見以各非色有脈之 故脉所必 病弦勝得病亦力之氣者。可而如其也隨也動口以 師動 原言搖次和。之本其振其條呼 决見春旺天之必應言 乎不振此陽吸 氣治然皆。之。致 也肺之一時如因乎脈 之肝理助春土內而 就也是難正 毛色也之時時臟九之

時。陽始生。天得溫和。以未得甲子,天因溫和。此為未至 問日。有未至而至有至而不至,有至而不去。有至而太 過何謂也。〇師日。冬至之後甲子夜半。少陽起。少陽之 師 如盛夏五六月時此為至而太過也 子。而天大寒不解此為至而不去也以得甲子。而天溫 而至也。以得甲子。而天未溫和。為至而不至也。以得甲 日病人脉浮者在前其病在表浮者在後其病在 而類推之亦師言五臟準此之義也。早。合初。條。所言前後。同。孫也因此一藏辨。色診、脈察。證於。顯微。聞、幽之。中。無非欲人。預治於 。王。則。肝、臟之。病。愈不。可治。矣是 ナ

為正十一元又氣天氣縮而去至不不因 初時歲始各未氣有也至而有出齊脈 刻必一之為常陰冷或至去至陰而色 氣氣不獨也陰而氣而陽人 之元氣至極一必人於也而太問之之起,所每之也。氣有之陰至至過日爲過則夜以氣後師也於氣故而等何有損不 半冬三甲乃萬天亦有不四謂未益及 以至候子就物氣乖盈至者也至求見前甲每夜陽一陽陽縮至氣若而更在 子子。候半之太亢虧之而之應至詳天

脈九平所者縱其以人十過已子子甲必集時 則候矣關乃無正一之二陽得而而子得之。病以師於偏窮而身氣候之此天天天陽以。 脈相又天勝之嚴之應無勝甲大未因和 也配就人其然防小之不而子寒》 之偏反其能於有太而不和和應故勝以逆自病氣過天解為為至 見為之寧者光是全生之也温此至未而 無診細乃致以其死中由如為而 脉病以哉太诊康中壽正此盛至不而 多之集於過厲寧正天氣推夏而至 端縣言是是之壽之悉之之五不陰陽正試若之人以氣考氣関偏十六去。之之而 獨凡病疾使而與乎勝二月陰 一吉天是及節時之勝勝身不時矣勝二此勝也。 一麻脉死身术 時矣 勝二 脉左不亡之善之善之十 為而 異右能而氣治氣治太四至太得得未 浮於三得凶本生順生過氣而過此此得天 者受者。而七太也,甲甲此氣紀

問 CHARLES AND LONG STREET 察縮可辨此腎痛氣氣氣浮上下浮可諸磁獨選明推病且逆而之下以而者類病 病亢擇其之故膝也極內以候言在推脈機之出表他言足腎也傷候上前前也之乎理方裏脈裏無虚蓋而下其後寸果自 此又詳虛雜病力而尺點其病較部何醫何求實見也更寒脈其病必寸之以 一甚起腎外必在尺脈 何之以治寒紛 所望法熱出浮則寒脈證在表於浮因 以色也與於脈肺起也又裏為掌者脈 雜診荷假指而氣必腎必為天後在辨 速脈不之下表無循脈腰人氣而後病一。 學而明故無裏根腰應痛氣外前尺之而 也言天义不之短入沉背內感後部法諸 此 也言 間氣背而强傷之之之乎病 通上於洋、不之證也 脈師脈 故與當然逆是則能證也可也日之 陰證細不之腰腎行也尺部不病獨 陽符為同極背虚必就部得言人見 盈方審如皆强而短人得溪

圈稱 問 を 一直を イブ・一直 スキー 獨滅矣嚴不而陰正何冷致此 厥 治無陰有非陽足脈分陽謂變之條 陽 未陰荷陰急陽以必之也也 而理 病有有無效亢配見血在蓋在示就 為陰偏陽其於合於先 診 通無勝亦陰上之厥爆陽之得預之篇陽之可以陰故陽陽為而之識陰 機類濟絕獨獨分陽得 則 危早推其於行行之明陽疾知偏 言證為而陽下也也津陽勝病調勝不乎察施庸陰師獨此之偏脈濟至 煩甚識救有陽日行陽勝亢乃之於 者。矣而援當脫此盛勝而之應法亢 則 上。調也乎離為大而必象之也獨 和即反而有之亢聚也間天以 之未是不陽極之於名 至而治無餘疾陽之 至於陰之陰脈必明日陽氣失成脈獨證故雖在未厥獨俱中 有陽陽成稱有胃虧陽行有漸

青身冷寫 四 (数) CHILD TO THE THE THE 氣雜之堅則之此 相于聚實爲病二 肢 百病皆然譬如浸淫瘡從口起流向四肢者可治從 日脈脫乙臟即死乙腑即愈何. 流 聚實為病 乘搏中要疑實以段 來 即 死人 入臟即死。如身和汗自出為入腑即 虚爲不之聚刑諦乃 口者。 而患能乃之則審因 腑則愈此為卒厥何謂也。〇 血開胸邪為其陰 卷攻氣解膈也氣吉陽 之臟俱如之所寸凶偏 可 治 腑凝結間以脉生勝 矣結胸結沉不死獨 病 設于之聚則應也亢 在外 入胸類實爲沉問之 心肺是邪實而日理肺不也而邪見寸而 謂也○師日非為 者 可治。入裏 能於正而沉脉明散是氣滑且沉其 師 布實亦更大大騰 者即 愈 邪於邪因爲而而腑 氣管與之邪滑滑淺 唇 衛聚個氣則沉深

病一問以明獨故又設定 通也 之属三 三隂 理 間俱可 按脏 乃直中于中 俱属隂故日 变高操萃病 計 不可不解 小脉 野三藏 症乃久 75 **光** 焦さ 以宣 門時 由必也即陽危氣已青下由然愈通也乃絕則 何中 唇膈得邪 此則 陰歸根面 青能 於故部 身中 Z 邪邪於邪 陽腑即盡冷心 寒 就 胸 陽腑死青 為肺 得之隂 也。以 身矣 至 寒 也 寒於戰隆不 攻勝入 冷冷直厥 汗陽而則中何直 寒臟 則與肝 和手 寒 者 汗足陰 同 厥之 目 冷氣 陰 出逆臟 者可 陰部所宣 唇 所寒者以達臟 寒知 П 之胃犯所明知之。陰邪矣朱 病 陽必乘之為義之寒陽色 色證胸以其

間辨故脫附實所經如元脫絕此謂脈師首。 有於腑可於邪脫由大真雜即陰之脫既篇治 看虚脈以真之之之小內於可陽離入明以於 聚實見决元散驗道腸脫腑决離陰臟陰示易 邪表脫其無故是路如而獨其脫獨即獨嚴問 氣氣即死他以此倘膀祗不死之陽死陽霜功 卷然者為腳物見脈有脆為死日脈孤人孤堅用 之附如腑中可脱之積如腑而也失則腑之水矣 於此羽氣存脈見聚三氣愈所其陽即故之師 職矣决穀兒機寫閱氣有其死由陰蓋亢哉之中哉其有脫也正證血邪說矣於亡脈陰。於 邪於生物爲臟之脈物腑非陰者陰者之 散五死可臟中脫亦之中。臟陽一脫離故 必臟之積填氣多必邪如氣之臟矣也間不亦問帶內血係見所胃之氣氣見何日

進之陰內皮者元也於乃完脫受如於至 淺陽傷毛可失腑表爲爲必其臟臟臟 深而病而治守脫外的臟腎氣其而真 亡次五由經腑也也之畧脫陽此見不見 燎第臟軀絡病臟故疾以而先腑脫能脫 如而之殼由也脫可以明死脫如之崙豚 指病元中經入也治驗之非久脫必主也。當機與之絡裏所從之日腑矣亡死於六 耳之。此氣而者以四浸非脫胃其也腑腑 其血腑即明肢淫為而腑真惟雖亦 次而由死其流植一死之氣胃真間 第腑腑臟不入從病也陰容府脫有 也臟而病可口口百其脫不一尚真 明之職也治者流病理必死腑可氣 乎除此故推邪四皆又脾乎五以失 此陽其凡之氣肢然至陰然臟補守 内由淺外凡疑者姑 微先胃六**換然**外腑深感病聚邪就矣**脫腑腑亦**真 表臟也病在必氣浸哉久之皆不氣 之凡由外真開淫師矣陽稟至本

問 国要界方勒本義 卷之 得下 此不中共人者除者入也分親 病 便自 利清穀不止身體疼痛者。急當救夷後身體 有 調者。意當放表也。〇 急當救裏救表者何謂 不多病類布之為身可占地平原病療性之氣獨之微飲中天。與之流病。在天水、大學院信食人中, 欺 夫病痼 也 疾加 師出病醫 المستوند مورود ورايال 九及寒爲行之雖此節 十之極亢之氣五五裏 **八**那熱陽大天寒邪陰表 類皆而必經地熱之之 病當 將能言傷經之 外分 疼

一經者可施

師 苓湯餘皆做 夫諸病在臟欲攻之當題 **数** 喜者 此 也裏如援不治忌 日五臟病各有得者愈五臟病各有 和之表之倒須而 解病、裏術行畫施條 爲病病者素不應食而反暴思之必發熱 孰逆 一庶乃 病後乃治其痼 人病先施非成因 此 爲俱兩熟非水功病 患人後徒其有證 也各問無標次 病和患日益本第雜 其所 疾也。 解也病而緩而申 表自有又急用 輕裏有急害之法表 得而攻之。 邪之耑救之 理合 法治喪矣而機先有無救師逓宜後 所惡。各隨 。如渴者。與猪 和時所表所施也 **解亦疑者以其病治** 治雖 之難阻何必 其所 也 可用如謂示焉多 何表也救鮮端喜

矣况在 和解可 暴而分 之為知威病理利救內止 卒久之他先同者其則裏穀體如腑散 沉後為其表內 THE REAL PROPERTY. 表 元 外 緊 併 脱 内 圏 邪 無 痼 感 さ 白 正 佐

其溫先此理長之因食人能有與給所先 言則矣其其病物之傷所之求喜後師 所凉 三諸治五病臟而叉性其惡能之大病病臟邪與反易情正各助仁 後法在必喜可之暴於為而隨其佈所而條可也臟因忌見不思觀性益其正也忌病以 見欲病詳所相欲辨情其所而師所邪明 效即攻情素喜宜食病而那不息日也欲而而問者食此者人其喜其五 如攻治補宣而之病素之病者,雅勵之 泄之泄明舆必為不性必而其病所 者溫五之撥飢應情增為病各惡 京氣而熱渴食各也病可有勿之篇所無以者有此犯愈所施 泄法中。尼盆害不嗜病其也得此不也。 格其法俱當者於之喜妬之所五如又深 所以統黎應氣也。食百性忌臟 喜該于觀遠血。因之 事情而病喜 反而補是之之而與物皆亦與又者

用綱領平鹵而之惡反思而火道斯推而以得 形携而仰莽畏下而其逕姑大矣有焉先務水。上领意景從斯也實好矣與寒即性凡與苓則 之該將事無特深惡是之。但或情病水湯水 下。法詞似股以思惡愛其真熱情斯莫 理於有金人盡無而順所者思有有不飲水所 卷氣內窮匱生病格喜耳欲正飲真 之一外而諸命情物忌即得者水假忌於非乾 一貫本理病則而致之可者必之斯皆臟隨清 木無先又神知理因乃習類病可腑其熱 先盡發出治心未其即而是有諦凡所治。 諭下理學始然所安也正審臟喜其而 十工也識不得深焉亦變之 三之下被形而恶候在如而皆實邪逆 聰之變首下此測然實者者人大施有試是又 明 間化冠者者疑於不不變隨熱推陰之遠是 平何不而上。 欲過者其似心陽哉其所 知明中三足論阻工明因必听寒從 而體寓卷與明遇心其病見欲思欲陰此忌也

				余謂仲景其干古一人平。 於聖者能繼往開來如是平。 → 大

發 埶 不風名寒言原而名此同寒之傷癌應非病係 而同寒之 痙病 汗出。而不惡寒名 病發熱無汗。反惡寒者名日 痓 濕腸 脉證第 之熱爲病反 為寒惡無陽名 旌 方論 傷言不傷太反而太病分 剛 太惡寒陽也不陽也言陽寒之傷發惡之表之 / 左 | 極 即 首首 作 脉 證十二 〇太陽病

也出寒純之陰風表寒蓋寒傷寒治俱雜性邪挾外痘傷風寒之 衛或 那族外痘 *** 問 寒,大 易 寒傷 應 傷 定以温寒定邪 太太衛為 寒 濕邪 陽陽 从 而 病病。 也 也 成不惡寒。不過風寒自 自寒柔惡 執 之挾就陽表不寒乃也太濕風邪外獨所所至 然表惡 所 又風風 寒而非有 陽咸寒 寒 必可為 於以為 處那。 電影 北 数 矣惡

原反屬仲尚名實性見者濕證 卷風揚雞病 而 敢滋論關威之陰症者無可不 之黑之縣本 有 有 是 不 高 而 分 成 在 那 为 不 不 不 而 以 也 家 随 所 大 為 而 不 高 而 分 成 住 明 多 不 高 而 介 成 在 明 多 不 高 而 介 之 合 挾 突 見 利 上 仍 各 一 風 為 陽 分 熱 附 又 之 已仍各一風為陽分熱附又之 有卷寒陰邪柔此。于豈中 尚不則以乃之濕風尚風 痓 脉寒陽為 同太病表 名過又灌就義邪寒尚中 在陽非病 難 太中傷必 治 陽風寒審 各相温为身但无感一 亦寒之所 應之中挾 浮脈風何 也應中邪

下景俱在表濡之 立為除特易表中軟矣。奏脈濕明為全風則更 汗不知條 多然禁 膚者致之力賴寒細兼而 功便起日非裏之之乎沉。 而也也解 致有太崖 大難同中內診 故語變治單正則也中 知其耳。正中氣為是風 言在設恐風及風即當 者。不可一種,因而成 者,正風者,治旺濕中弦感 不寒。 知或感 知或感言 其但人其 山中能致 風成變 矣為 房 房 房 房 月 日 日 日 日 陽家處司 沉大仲雅濕病之

可濕合乘乘其宜為 以中濕虚汗人發俁 手中風耀寫裏苦 曷陽則途表間過汗

炳 搖卒口噤背反 不矣道之孟治自至悞急聚出經兼 頸 張 三梶洋其易虚也者 項殊急惡寒時 凝其。血風以勝邪濕 宜汗發汗 汗瘡邪而也家相為 而斯正致血 為大虛液熱 以宜又勝汗、関 鼓與則活 乃取汗也 〇若發其汗者寒濕 (其氣,此,經,派,與道中之一,原屬風) 頭熱面赤目 一經絡。 在落。所以拘之正氣傷、汗不不宜,不不宜,不 赤獨 因血遇外 病于衣亡此邪 成, 脉被若於而 瓸

謂出痙病根 嫉 記事ははいからり人間となる人 惡逐熱此氣為于挾而鬱也邪辨由諸 不背内熱熱閉頸 整之假證 于請治示乃 為反而之愈其項 條舒張越邪深表强表言 所通無道內濕濕急分柔成知 即 正得其謂病非空經挾挾面則擅 既其痙 成汗柔邪風虛所熱熱赤阜如言辨病 愈為汗程瀰熱風謂而邪 目熱病之驗 一出本没鼓行濕上盛赤也者然家而證莫蕩于上炎行獨所身剛 此表表也制于身甚炎于頭挾熱控 正虚法此中而為甚裏動之足柔 太已生當搖而筋熱而風搖濕寒痙立挾 骨者風俠者阻者諸法 陽虛寒驅病濕 脈 中不且風中邪拘此更濕無 如 何症而 裏也之知柔 固最智急也屬而非 蛇 開出衛盛滯為以總外風及外情禁煙

散而除之其啐致為赞挾則鳳狀也者

於濕濕邪間口血風鬱濕足之必痙

邪清也正噤耗濕久邪寒風

原

形容如蛇奸

可伸太及濕

合用と見てイン・門と言

(接) تحر 此 腹 當之不欲脈 變而 諦 因 狐 展大者 謹禁急 議也為 ·急馬匡 救平。 居。因。不。能已 那也之證用條 在痓如變法乃 也。今、又 之凡 陽表病則無明 勿惧柔 為欲解の脈 所氣 上下行。 **が證其病假**痙 能蛇 却 也人機也病 也產此 屈則為 而暴之痙之 腹腹進病本 痊 瘽 而終 脹脹退中脈 如故反伏 無 去。留的。 風 由 也此識痙知 表痓是 四牌為發汗亡了。在表。可。知此一人。在表。可。知。温不。能也不是,不能也不能。不能是不能。 傷證病不明辨 悞 罷諸可 必證不 可之 大连 邪裡之為明變

審其脈

而不能入<u>壤</u> 制润則在丧

脉漫脉若延俱如大入伏矣爲其外陰 也何候觧傷而裏弦乃欲了熊痓是暴 矣寒病愈矣診愈墜不病必脹病 之之 緊而成條過何傳不深弦之 已也即脈機性濕說 如脉痙所也至 雖必之者。仲細如也入邪也 直變則沉然貽入則景脈故如腹相蓋而竟亦 之上矣濕而痓濕裏濕仍之猶是作麗 二下伸邪細病邪也氣名有之 診脹而 行景内者之内設內之力平 之矣後之 者太乐風 盛日 證之維所座今陽必寒邪原傳 風申邪家變憂之致可更痓浮外無屬 初脉乎。於固知伏病而解所風 也。其盛感可此早。屬痙而之不而依寒 從之病深沉沉 **脉熱寒矣醫表太有見細緩** 下不濕脹豈 日為挾其家證陰暴此也而行得必認可裏 大患濕本失治而腹知且不所不風撰 于川非脹邪反弦以順寒太解

如政智另作 故反伏弦者 二邪已桕離濕邪與風寒 服病原註少 捶此中無脫 书為欲解乃 於琴腹脹大 太陽病其證備身體强几几 **填啜熱粥發** 石六味以水九升煮取三 象俱為那,我不 枝湯主之。 兩 兩 大枣村二 兩 然脉反沉遲此為產話董 因是以求病 M.こ.形。為形。矣此以之。於。也。並正。脈。失。此、此、疾疾濕流連于 E 甘草兩 邪 也仲

と野更とう耐くを 恢 枝滴微正去補收內寫示着那必也然不 人此 湯若汗所于中飲鬱陽人之中緩如滯惡知 法汗同以下。供除之微日形太今為重寒所 不於通驅為不熱或此俱陽則傷不也辨 出出傷滯風風使以為發見則遲寒便且也明不毀寒何而邪營桂內脈丁浮是之間其太治 卷微熱太非温言血枝寒為脈緩沉太旋人陽痙 寶粥陽驅 半治。妄生也症矣兼者陽乃不病病 粥發中風去而動姜主不此乎浮中風止其中 盡亦風除于濕致之之得痙濕之風邪 劑。同服濕表亦汗辛以以病邪對也挾項備痙 于柱兼做可大透括沉之中運其濕强則之 非傷枝治陰除出表蔞為所太者脈氣急所法 以寒湯之正矣以驅根在以陽緩必中更謂因 治太法義所蓋廿風之裏為則之淫於母發詳 風陽不平以洩草以苦及程滿過个太體熱來為中使共逐熱大芍淡在病滞也則陽亦汗其 單沉之强出脈 急風大服水而不來其陰也之 而服汗法助濕助之風經仲象為其本儿而證 除桂流取胃半胃酸濕遲景重風脈證几反示

諸藥煮取三升去滓溫服 右七味贬阻以水一斗先煮麻黄葛根減二 葛根湯方 剛 太陽病無汗。而小便反少。氣上衝胸口噤不得語欲作 合理はサイフセドスコー 葛根四兩 甘草炙两 如桂枝法將息及禁忌 痓葛根湯主之。 陽中風湍之柔虛病立治法也。 生姜切三片節 大枣竹 桂二皮 升、覆取微似汗不須啜粥 芍薬酒 一升去沫內 洗兩

を設定するう人間にとえ 芍何氣之並用葛寒陽頭也散作其氣言人此 藥必上用治麻根那不項何寒剛人又也知條 等用衝柱又黃發則過强以為痙素上小辨 四桂胸枝為亦肌凝在急用治之有衝便也申 物去二意法不內滞衛所之乎勢積的不太解其皮證在中足中又放以於仲已濕是利陽治卷義乎。故溫用治之在以連剛景成故亦濕無痊 不去耳中法兼邪營柱身處主容與濕邪活病 皮若助也感者分枝體蓋以不外邪與則中者。無陽其之不矣之皆症葛急邪上風必剛 前者無陽其之 條治此以用寒足營力强病根以相逆寒反痙 表二除桂邪為衛可也多湯點召如相惡之 論者證內去矣君合勝且在葛風也水搏寒法 服半則濕皮而主病驅風太根除口氣 法而亦因又太之而馳濕陽陽濕噤之 亦治桂有不陽品濕之之陽明之不上之條其 悉裏枝小同陽矣人任邪明發中得逆化剛脈以者是便于明且從如中之汗而語也不座證 桂半用反柔並非道再於交之兼則是 枝也又少。座感兼非兼太也藥以欲必矣所示

瘦為病。上 右四味以水一 大承氣湯方 可與大承氣湯。 そう日耳 ライフ 古門 スコー 一升去漢內芒硝更上火微 芒硝三萬四萬 為病一本瘦字胸滿口噤卧不着席脚擊急必斷齒絕方去皮。定非用柱內。第二十歲之一,此乃中用柱。如治法。也。以方中用柱。 冼苦 斗先煮二物取五升去滓内大黄煮取 厚朴多去皮 兩沸分溫再服得下 枳實五枚炙

即法况那表既豫其齒鼓食功然為表此思非熱已證除其壅即動不矣盛柔證條 下為得盛則獨勝閉俗于 于忌留热再言脉矣痓 之經脚滿級其 下圖 而不在上裏之戏乎。謂筋學則實治法邪濕成傷為耶亦而仲此俱急濕甚矣示壅 熱實寒熱不庶濕景危失日熱恐然人盛 未而亦也知幾之言證其夜內非有審 言有則症易存可也常不 下病為馬與能度得可於 在得瘀之至力者大不矣寧知治鬱用 熱不此矣寡承急驗貼也表丁之於為濕或矣氣爲之矣口可表也 湯舒必風噤奏 有邪蕩通齡邪飲厥內病病

時承於混疑 尤氣博凡慮 之病若也故而陰風則 瘦間中無故陽陰而兼 病立亦風柔剛本風乎 有湯冷引致濕 醇一而證 娛熱 名有而痙而柔 辨 俱寒固陰今 酌方引之乎。 於除說故邪。 豈座失相病大 風資風濕有柔反寒感風 可病當合之

條有推騰絡必行營之經三非能陽陽身 者而不求腑襚阻之而外病院但仰而明之風若並敢本故道塞道脈爲非有言俱非所後無 言無信原日中壅路之濕臟痙背于以行太經 傳傳也而經爲滯也內所願證反仲六也陽 經經再論病患而雜爲濡病者張景經經所容 卷何之煙之也耳拘錯濕滞也非而即分所行再之日煙病若凡雖急乎所矣風仲間不陰謂也疑 為病仍竟言與蜂邪浸風濕景欽着陽病經 經也終言及臟擊風淫濕之原畧席也于所再 盡痙在為臟腑之邪矣挾邪文于脚病陰謂痙 乎病三臟腑相證濕脈寒中所後學于也病病 此有陽腑內屬見邪者之于有人急陽以于者。 仍建雖病陰而矣寒人邪太不待七不人陽 是條有非陽究是則之中陽敢其字能身也陽 戚裏他虧不病脈正于雖信補中俛之感經 日施證景足同悉行氣太在也叙形病胸于病 終應原者於在之正陽衛再也容于背身也 陽身下文止病人道血雖而痙凡出陰為之感 患之所可在經路所在脉病言之不

煙經濕殼小延之終人仲其濕內內據寒更日 便邓邓身何景疾 那一葉反此人為得言塞甚素生言何為明 謬得驅亦少傳臟患云證之 明雖此人於待經寒而並于濕 久之發與裏甚 佛豈 胃容上 或能傳故間所

又以其明認為名不標為除盛矣俱經言者 有治標理為臟分外易獨虧而或可之人遂云 厚其以者臟腑證用為是者陽問謂邪兼謂 望標臟詳腑之而法力濟濟亦痙之有有之 于又腑審病病於于耳陰陰微病係及此為之後何為標而故臟經若扶陽不無在太濕太脈 卷賢臟在本妄仲腑而夫陽微理屬太陰邪陰浮 之所裏之生景之已標雖者其於陰也関病而神之為問事終本。他治屬扶臟臟不辨係必緩明不本以端不未景則治陽腑腑可乎太然手 乎可病症反從當所仍臟凡將然即此除謂足仲通而病不臟言以以腑病終風謂則平轉自景言治為如腑及言驅不皆從熱之。小日屬溫 者耶其在不立是極風過然經盛為便陽太者 經言論究病寒從何絡而太少微陰 ニニズー 治為之也不必除共獨為陰陰氣爾矣在 可就濕本于治必痙上而不太 其標為正 本病愈恐謂標熱治痙乎虧病衝非知陰正而也人痙病爲俾有答寒也等謂仲不 **所治倘悞病定義治異日濕明證傳景**

倒痙 裏不道邪陽之遲腑所多之風寒煩濕痙 病必必挾中脈亦之以虛不寒挾脈痺病 脈 進定不持風証不說云其能無濕沉之脈 非沉能為病之必及難正奏濕咸細脈沉 寒則浮患而可爲另治于功解人者証細 病為出也脈也他立也。表矣之成此之 者裏而濕何中說太合又必發痙名可治 且病快者以風也陰乎慮兼之風濕也之 有遲捷濡沉條即等濕汗理易寒痺濕理 **广则是滞而云以痙痺出其為之可病不** 况爲風下不太仲之脈不濕力邪知條必 煙寒寒墜淫陽景名觀徹而兼自濕云為 病病挾之遲中所也之存痙挾外脈太他 乎也濕物而風言再自其方濕入即陽說 合在即附過脈傷者不邪除邪而沉病即 傷傷可風緩浮寒柔必于於单濕細關以 寒寒為寒則緩太痙爲裏是言多之節仲 太中沉而因今陽病有此既解由脲疼景 陽沉遲行有亦中脉関供慮之內也痛所 中非矣襚濕太風沉臟景活發召風而言

爲在此胸巴緊緩痙脹當本欲表脹不云于。風 臟經就滿為也。矣邓大風地愈然大得暴沉脈 腑在腹小內此今故此寒親也在者謂腹細觀 病表內便濕乃沉其雖外下不表何之脹之 言反召其遲痙在透風能之以有大 可乎濕少之人如果腹欲寒盡風爲閉者說不卷信明邪等入素故為亦愈氣從寒欲臟爲以必 之也乎亦證腹有反依于之邪外欲愈腑欲情定 再此尚而故內加愈太晴太透愈風且解於 者條不已腹濕伏也陰其天也也寒另脈伸沉 仲言得其雖風弦則臟濕親其必之為如 景證謂病暴寒伏脈無邪上勢從邪太故 原脈之白脹仍者必涉必何必外與陰反支關 文而為為大在沉不何下。能從透濕症伏也臟云症陰症是之沉得與反下而相之弦再腑症病不至而謂而其洩所雜谬者者復 病無為無欲所弦浮之暴常濕挾而說痙仲强 發陰臟愈作挾者不爲爲性亦之感也此景爲其經腑理上之細遲太腹乎。水濕人暴條不較 汗不况也重濕而而陰之故邪邪于腹亦文輕

恐必證太異一然此按家病風邪而故寒觀已 病區如陽者字。直一之其矣非故直見太之其 耶畫頂心脈之上體弦脈有濕汗上弦陽可脈 艾而無便脈亡。濕在之風痙 經傳能病弦褲部 贵已寒所道脉邪脈不不病 之于何之繁行之 脈何不脈已之為可病則以之。行在道止成脈 亦經能其直妙寒以邪少為裏如內故症而按 直試絕證證者,热沉全乘之而蛇拔不病風之 特里為在軟剛寒知弦分為病繁 下。直卧多部不為裏脈所准為此而寸然原如 豈上。不兼矣知虚以道以权或則反関也不克。 能下安三正脈貫進中為和兼座伏尺惟宜直 復將席陽見者予為成之脈或非惟及其大 辨於是俱痙也可寒脈柔經不風其左為汗。下 在何也病病更見耶另痙云兼不為右風在行 經的之威可執不。其但權之壓風馬雅

附 四段子。此世醫言為民事不知,是一個人工學, 故。而 -

陽病關節 方。虚小醫小 濕病 尚無見所見之 宜實為以比談 兼腦害有矣驚 疼痛。 顀麝更產雖風 其金甚後有稱 虚石蓋萬熱傳 大便反快 库而一病 花兼故之 而煩脈沉而細者此名為濕痺濕 科學小風甚方 風其證 啊不兒之總者 但當 宜內名屬哉 之用熱也,陰至 豈即尚腦虛于 世極分麝虛婦 醫病虚金 太月寒。五年 中實石熟產 便 驅婦此熱 可風人而生痙 散產用風病 兼受治 安熱後之此又與諸有較世非 高風病法

去外幹淫遂內諦為单正定者附而傷也 住河非運其不外其細在濕義多於沉寒關仲 着北先無性行濕病矣表氣濕而別細之節景則賊除力潤而氣因合則重而爲氣則太疼是 内太下。小相外證脹着挾病非濕陽痛 濕也濕陽未便合有脈浮之寒于風氣中非必 宣有必足濕而緊 太則感寒頭辨 導不不以邪觀个細邪陽寒人 之利驅不致利阻中之隨而相者今而但體根其逐速大矣塞表而濕不合同感寒不痛 便小人則濕在緊 不也人邪 便濕致之便身內瘅表亦須仲而附熱此如 以所濕快不正濕之則濕疑景闌之 洩謂存也能氣之證脈氣矣名節耳煩於 可濕去于是宣流盛躍變濡其之疼濕 水朝裏必洩通于如為軟脈日痛氣之節 之沉濕知不脈疼陽 診而痺附孤不痛經 中而平而之平目沉 水道日前緊 而應附孤 氣可矣亦蓋不辨 難于土浸化知再變寒沒名寒必累于

得飲而不能飲則口 滿小便不利。舌上 八但頭汗出背强欲得被覆向火若下之早,則歲或胸 風有矣而 多內然後 此 家之 便為除濕家第一寒。而除挾寒之恩 者風必可係 為病 為疾病症病中亦有疾寒者則寒不過而後可以召外風耳故疾寒多者為濕有內濕而外濕方來投合,一如中風家后治法也太陽之表中濕挾寒。便為濕刀申解濕病在裏峽寒峽熱不同當辨 死若 身盡疼。發熱身色如熏黃 一如胎者以丹田有熱胸上 燥煩也。 利 養也故 上者亦死。 利 濕家下之。領上汗 也 過濕家病素 寒渴

壅裹矣感之熱為者必機內附者忽更陰 盛亦是寒因又濕打更耶為于外也分陽 寒平濕也高瘅被明故濕寒感蓋表以原 甚濕素為此積之疑其仲寒熱之濕裏為有 **戏總之內濕其久證團積景為不濕邪不偏濕** 而無因濕輝一之也也濕必濕能非總容勝邪的下也本之也濕而如在分熱肆附為產是又 之滿理此寒證再熱發濕裏之幾于于無混又有 二小若又為也如也熱家挾既何裏風住者就挾便下其積而濕是身之熱言不苟寒者此其寒 更之一久欲家表色為挾其混不不之辨裏挾 為見也之得其自如病寒濕投明能邪晰氣熱 濕則濕寒被人寒熏一之在湯其中必之為 氣濕熱濕覆但濕黃身辨表劑外于依於言 所邪在也向頭證則盡所恢而為表附至與同門得內是火汗而平疼以風總風內于細外視 寒陰者表惡出裏素外為挾無濕蘊物學感 氣寒荷亦寒背自內感治寒當為之而者之 所之不寒之强濕濕寒濕之乎寒濕後不濕日 格藥至濕甚亦熱挾濕邪故病濕非行可邪

氣危出不意濕但津為之之 加下死利絕矣盛矣。不發渴寒是熱 不止也其逼濕之早不而于之不 治其所小陽在早之治濕高濕似之 表爲以便將裏尚變表邪分熱傷下。 分上仲小上之如證分與濕為寒挾 而 解值 越景便越寒此也之寒邪下之濕 下以反之濕其治寒藥愈藥大 下濕者又又正丹胎

多但 公正は日ではアプトリストン 未風軀于矣醫者濕濕病感此 微有濕殼表兼用言邪相中表條 微 但風氣去濕氣 此 可 後者內氣而不在于言以然解 出患在濕仍大效表関也示仲治 汗卷者表相留汗者自節一治景風 者 出 在是故一 也原合衣出值應之身濕示濕 應此被人天汗間盡廂人合 濕 但發不之身陰而也疼發以邪 俱 不愈也若治 使汗愈間之雨解此漏汗治感其但之復濕不此就風之痙表 去 也 也蓋發 人發山山氣止一風寒法病之 微汗也腠亦之定濕感也發法 風 若鑒理大時治寒于風汗即 使乎還盛天表濕太濕之治 濕 其汗。 欲大此着風之證感陽相法 者 發其 出汗則其寒濕之干之搏於濕 汗 汗流凡人雖氣法其表兼濕 者鴻治之去盛也表而寒痺邪 出

濕家病身來。 則愈 能飲食腹中和 合日真有子フ南ス事 、蒂散方 濕中風證合戒仲也無雖 ○ 大田 (1)○ 大田 (2)○ 大田 (3)○ 大田 (4)○ 大田 (4)</li 而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自 頭中寒濕故鼻塞。內藥鼻中

上寒當之主可犯濕能大如濕寒家。 衝濕內竅持使之者飲濕傷病在內 二頭亦藥所也企地病食脈寒無表因 目無鼻以熱山令邪寒應中頭也濕之所电必邪非頭在濕細風痛發熱 法依溜塞引寒中頭在今陽鼻熱 凡飯出但濕濕有為表大邪塞面 濕矣濕通邪外寒患則則鬱而黃辨 家此水宣干邪濕也腹熱閉煩而證 內治濕其乎自則頭中盛內之喘 因濕除清上能熱中和可能理素 於家則氣清然氣為無知生挾有 濕濕熱于之也挾諸病也熱熱積立 熟熟散上分有之陽而其之則濕法

必法。復明寒濕無可攻下之理以示禁也。濕家身檢此條乃申明濕家寒濕在表。為之立散寒除濕發 取二 麻黃加术湯方 火攻之。 而類推也。 者可以比照 一升半去滓温服八 上去皮尖白术两一七十箇白术四大三两 桂枝二十 去二皮兩 甘草炙 兩 講

智之論 一不犯難治

濕家 湯。 麻黄杏仁薏苡甘草湯方 出當風或久傷取冷所致也可與麻黃杏仁薏苡甘草 全国度事方所以及一卷之一 麻黃去節半 取小固治杏發其煩 微水為表仁其表外 汗為熱之降汗之感 疼發熱日浦 甘草炙 所劇者名風濕此病傷於汗 兩 表成的一种 薏苡仁 而土柱可 兩半 内更枝與何 濕病之裏以 因以驅麻因 之 取太黃惟 盖玉 濕微陽加以 爲汗表术先 利寒為濕湯治

俊) 一ココーニンオーノ門 之出感濕發逆內逆 此 剉麻豆大每服 當人者熱之外之條 可集風 避 见亦乘風於何 日 股可濕又表此點 證整治不 皮尖纱去 風 雖寒以則或則風所可內法 互除風亦久仍即劇不熱以濕 寒温濕可傷寒因者防必示 四 亦治為謂取濕濕內也愈人寒 附風名之冷相而熱如甚知濕 鏠 水 丁。濕也寒所合兼甚病熱所在 風正即或致也寒而者愈辨表 而所條久也故也除一甚驗內 盡半煮八 111 · 津温 痙黃取雖于乘日濕爲熱防 服 冷為汗濕風也水在水

夏罗罗方和本教教 卷之二 黄耆 濕脈浮身重汗 剉麻豆大每抄五錢 防已 法百逆裏甘體慎有 也當請以草仰勿風之證香湯景以亦 分一 去兩 蘆一 兩 更仁以者風 以意麻矣温 微苡黄仲二 甘草 汗降散景字。 炒半 出惡風者,防已黃耆湯主之。 兩 風其驅此於此 為逆濕證濕 戒氣干言 半七 **鎚** The same of the sa 家因廿與平閱 丙之草麻寒不 外濕温黃也容 了水子苡善

煎 搜 屬之于重之也挾此 防補以外而矣如將條 防而汗診濕見乃 以 生燥已濕出共不應了姜土黃寒則脈外寒解被 出其家虚申 滓溫服良 分 ○服後當如虫行皮中、從腰 固者積陽浮感之 繞 分 表湯于做介包。之乃乃一之。之乃乃而感風立風 氟 英已陽表之濕云。 大宜氣不黔之,于外 大宜氣不黔之,于外 再服、 温 令 衝 者加柱 也服治感 中風表內 惠器之有 者。 枝, 加 不可不同不同不同不同不同不同不同不同不同不同 麻黄。 分三 審惡之 旅者味也風召寒顏無黃內而仲風也濕裏熱 兩半 如 水 有 之治外景濕且前 後 陳 胃 用者盡主盛身言治可 坐 寒 中

というだけではないという 虚不細水行皆越根濕吐藥俾中凡寒寒可辛陳皮為庶也邪利之熱見在之 之者即溫寒中濕無加上矣酸隨 法立謂經在寒家額細逆氣以風 日風 地。 下濕內上辛則上收濕 出辛不加正越黄 搏身 陰效坐咸寒微溫上桂氣于喘濕 經也被者思喘散衝枝於表則者 寒繞欲患小寒矣辛 表預利陰有達 入溫解之證則寒清濕和之此 能自 1. 防止电阻性量的 1. 行法,接近任一场了 也者致陰正氣邪恐 分。微從也蹈寒內 因上洞吐欲乎。 濕而則利其加 寒不不加宣减 以汗腰服危不 逼 之差下如矣陽寒不 因又则如虫此

桂枝附子湯方 渴脈浮虛而濇者。桂枝附子湯主之。若大便堅,小便自 右五珠以水六升煮取二升去滓分温三服 利者去柱枝加白术湯主之。 とは日本インキースキャ 白术兩二 「术附子湯方 甘草二两皮肉 十切大東六枚 附子一枚生 大東村学 附子三被炮去 甘草 生姜河兩 炙 兩

主之。 並走皮中、逐水氣未得除故耳、 **痺半日許再服三服都盡其人如胃狀勿怪即是木骨** 短氣小便不利惡風不欲去衣身微腫者。甘草附子湯 風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出 右五味以水三升煮取 甘草附子湯方 を見見する大変人後之一 桂枝四次 甘草 二兩 附子 皮臍破土 升去滓分温三 兩 服、

枚證多 放始終加 濕病無傳經 轉發

宜 **西珠以水六升煮取三** 一服六七 盛陽非初傷復可表 也明。傷處寒外不矣之。二九千 。巴當內。 則無能食汗出 明 風 外衰內煩外間濕挾顧所濕 者濇無不感至相濕其以家 久為熱能太入搏之虚示外 而自陽九陽轉而。 升去滨温 復煩者服五合恐 身邪寒表 鮮也微則為之疼當其兼濕 者此也可濕久煩何真治內 日寒脈見家證不如正之因 服 虛重風始 治重于而而寒終矣。也內濇寒外如 服 一則乎內無治是自如濕熱其

原山事「インネスコー

運俱未為當 官少監展後 太全運幕日 頭亦有皮質 熱心性上于 白汞附子属 徐不附盡平無升額大再原柱後家此風經大 侯能之而况非之上便或文撰可何俱濕為枣之。遽力其大為於汗雖大以陰言獨非易治甘 勿止走人發濕上出堅便立經溫不發相外草 見獨陽如汗家將微恐堅異明補然汗感之異之逐胃乎陽外喘其小也悖也乎治召用 港思太水狀此微越之犯便乎,仲三又表今蓋除 之遷陽水此俱計矣條下自 景陽不之惟因濕 病必法從其而 也病不非治耳于桂利利 此愈能陽濕柱前枝不者 陽定可其人微 又陽遽欲病枝方之止不 微牽稍本陽以 中入衆治微柱 |馬氣除上者之去升之惟| 虚此也則陰枝 服散濕越必升桂陽條陽 藥漫不之應陽加恐小微 即等在標盛之 後之。能冒詳且白反便且 證濕病致辛 不遂也求不术拔自中 陽了已當之用補孤利虚 不了。而勿理况中陽恐之 補三為治虛附 何中在治所 能也冒怪也發燥之其甚 速當自术服汗土根犯也

放從 之義非 中陽紅 不用 方中 講桂 亦如 公理可 用一 迚 法通行 濕圖為明乎其後濕也以子也去條劇再以復 濕神者此 額能相故其湯共衣同外或申 痺明在而應食搏用人仲治表也感風明 者也仲神中汗者木小景法虚小風濕其 中汗者木小景法 出從附便所亦 兼復外而不以與微不 理煩解仍利必前 外之亦衆則 雅候不以虚之同也虚 同 害桂而也温或校 無為其枝不其中。身 可致服補微與出 下法氣 盡燭其裏則脫以爆者

取土

调推之于外根解草之不與則

神廣处服風蒂者附徵欲前痛

一主。病以鬼

一也經陽太是於必之挾邪病同濕病多 又篇 不云為陽又陽明濕風又異為多則濕附不不可濕熱之見為乎外寒因而風寒以少以 上濕表濕濕濕感而內名邪少濕者寒 之以不言律濕痙倚陽所召病必風而不寒寒多 二見得之引皆附比弱附者又其邪表兼為而濕合不也之濕寒而者陽少以人寒裏風附風少為引喻極邪為後其盛也內素邪多而以多者 丙氏可一剛能濕而濕濕有自寒濕風濕瘦 篇經合為定應致必陰病爲內外之多爲少病 之之痙濕之在病附斷既主積感問寒兼者也 言濕熱性內之于者有病之者成少證柔兼 其濕腸之情因義陰其內不濕其受者兼疼有 實熱三邪也之此為濕濕同則常不濕有也寒產者者作至裡故寒必矣症外而同痺風若而 强為為注內附在濕附又病濕濕故也而濕

煙寒者此文與夏也為因而實此相濕崙明費 方下也立所也需裏平表景達首濕出 言且引證日證標 濕之風俱內言內言風濕多寒風而自 太陽寒家義寒從經也積也濕相以濕方兼 陰燥之濕終外濕言必之余相搏爲內有熱症 可土文甚有感病濕合根註搏何見因痙者。濕 謂固矣陽未寒中熱表屬此於以於者病自自 極本不微同濕勘之裏於二條為傷仲長有為 意之必證也內出文言陰條首內寒景夏熱濕 爾治風伸所因內以濕寒明言因論原濕因腸 慮也濕景以者因湊病不其其寒中文土之 同為濕濕矣却用故為 腑言博防叙理寒其義濕寒多也列以事亦喝 矣氏 内巴註同熱拘始上濕寒滋叙風方不之 於因黃於其又牽脩甚內少。疑于濕有必為

太 金属更思方面本意、卷之一 陽中喝。發熱惡寒。身重而 跼病 疼痛,其脉弦細芤遲小 1. 11. 便

淋甚。 燥若發其汗則其惡寒甚。加溫針則發熱甚數下之則 (14) 洒 酒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱。口前開。 므 板齒

之強也 不順接凡 厥 服 類

則也,表用為邪于齒致阻內惡府於之暑 之表或氣麻除者、板燥小而熱風應餘脈月虚 氣證加益黃邪內齒熱有不極寒之證也伏亦未溫處性非外則盛勞宣而之小小合陰 **簡解針內枝兼俱齒于身達寒狀便便脈** 之內則熱治治是燥內。即亦見正時已證裏 入熱熱已風其陽也欲熱可于繪氣酒而故氣 襄不益惡寒內邪此開熱逆四表動酒 氣能以寒溫外若全口病見末證於然之於故 化宣热矣辛不兼為以陰手且如膀毛而寒易 四 通 發表 發為 感內 洩 虚足 內 畵 胱 聳 中 內 於 滯于热虛散功寒熱其動皆熱也必太喝也感 小表不而之也濕臟氣則內為再連陽 便反可內品若者盛氣生熱寒驗及之病 必使消熱則發內之出陽外濕之於表 不熱息惡內汗爲證而也寒所于皮有識又者 利勢也寒熱以陽若內口之鬱手毛邪矣陽腹 而下數必不治邪单熱前泉其足酒則再病淋也下更除其而感熏開也氣逆酒勝徵由 必寒之甚而外外腸灼板以格冷然胱之來

湯主之。 右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服 白虎加人參湯方 金田男名不許才達 太陽中熱者賜是也汗出惡寒身熱而渴白虎加人 或為賜氣所傷或為寒濕所變俱于治賜之中必宜一字。正見三夏炎蒸。腠理疏洩邪易得人汗易得出脈怒及悞治之禁至是方明示其治法。而補出汗出此條乃申明治太陽中喝之法也太陽中賜歷叙其)此條乃申明治太陽中喝之法也成陽中明歷叙其 仲景因為明言治法于後。甚也是皆非治腸病之法 人參三兩 辟 也 甘草二兩

皮中所致也。一物苁蒂陽主之。 太陽中間身熱疾重而脈微弱此以夏月傷冷水水行 金度理想方動本を見るとして 石剉以氷 **苁蒂**二七 物苽蒂湯方 升煮取五合去滓填服 The same of the sa

剔方分 被須有層利 表分又有表

移 為為裏在水一行浴燥虛衛暑愈然盛賜之病病洵皮濕物皮外作故失挾必又必必氣 瓜凊温渴易其重當有正 带之必而身防濕 由表也以而湯中召思熱中為治受 主是濕飲多虛患其熱清法之濕疾乎汗脾于濕邪熱示 而水思其陽矣重虚 **搜病感令谷制也如挟乃所素** 故 診太溫 而乎 大子 汗而品裏煮腸太 多令脉之陽氣關慎濕熱 寫也為馬陽飲水見脈中者之 表可治蓋頻餘之丙惟中見賜則主 虚除太跼服證分濕其虚微身非法 陽在以而濕心中之弱熱兼前中又表皮散已為積虚象平疼治條陽陽 前中又 分外皮伸水冷故惟日重表言 之水中景而水每其汗知裏之 之以浸常口中多淡可埃熱

1